















13.6.2016.

## Obavijest vinogradarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze, početkom cvatnje ranih sorata, proteklo je 11 dana. U tom smo periodu zabilježili toplo vrijeme s povremenim pljuskovima. Pojava simptoma **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*) zabilježena je u zadnjoj dekadi svibnja, a uvjeti za sporulaciju na naličju lista i sekundarno širenje bolesti ostvareni su početkom lipnja kada je noćna temperatura bila iznad 12°C, a relativna vlaga zraka iznad 90%.

U vinogradima gdje su prisutni simptomi plamenjače u vidu uljne pjegice na licu lista i bijele prevlake na naličju lista, svako duže zadržavanje vlage na listu zbog kiše ili rose omogućit će nove infekcije pa vinogradare upozoravamo da redovito kontroliraju zdravstveno stanje vinove loze i provode zaštitu!

Virje_S34		Podaci od 2.6.2016. 2:00:00 do 13.6.2016. 7:00:00													
	 °C	 °C	 °C	 %	 %	 %	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 %	 mm/m²	
pon, 2016.06.13	15,2	14,4	16	99,7	97,4	100	15,3	14,5	16,1	20,2	19,6	20,8	76,2	0,4	
ned, 2016.06.12	17,9	15,7	23,8	90,8	63,6	99,9	18,1	15,8	23,7	21,2	20,5	22,7	54,2	0,2	
sub, 2016.06.11	20,6	15	27,9	74,7	45,5	99,7	20,7	14,9	28,1	21,9	19,8	24,5	9,7	2,3	
pet, 2016.06.10	18,9	14,3	25,1	77,1	51,7	96	19	14,2	25,2	21,6	20,2	23,2	0	0	
čet, 2016.06.09	19,4	13,6	27,2	67,9	34,9	92,5	19,6	13,2	27,9	21,9	19,9	24,3	0	0	
sri, 2016.06.08	19,7	11,2	26,8	60,4	38,5	90,4	19,4	10,9	27,4	21,4	18,8	24,7	0	0	
uto, 2016.06.07	19,1	12,8	26,1	62,8	35,2	93,8	18,8	12,6	26,4	21,1	18,9	23,9	6,6	0	
pon, 2016.06.06	18,8	14,7	27,5	83,2	51,1	99,8	18,9	14,7	29,1	21,6	20,1	23,6	66,7	3,2	
ned, 2016.06.05	19	14,2	29	84,4	44,6	99,8	19,2	14,1	28,6	22,4	20,4	25,1	43,8	5,1	
sub, 2016.06.04	20,3	13,3	29	75,6	43,6	99,7	20,3	13	29,4	22,2	20	24,8	34,7	0	
pet, 2016.06.03	20	13,2	28,2	69,9	35,7	97,9	19,9	13	27,3	21,6	19,1	24,7	11,1	0	
čet, 2016.06.02	19,1	12,7	26,6	71,5	43,3	95	19,2	12,6	27,2	20,5	18,3	22,8	3,5	0	

Cvatnja vinove loze na ranim sortama završava dok na srednje ranim i kasnim sortama još uvijek traje. Unatoč cvatnji potrebno je redovito provoditi mjere zaštite vinove loze, a tijekom cvatnje izbjegavati pripravke na osnovi bakra i sumpora.

Za zaštitu od **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*) krajem cvatnje mogu se koristiti pripravci **Ridomil Gold Combi 45 WG**, **Forum Star**, **Pergado F**, **Galben F**, **Fantic F**, **Melody Duo WP**, **Galben M**, **Profler WG** ili **Electis WG**. Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronosporne prednost dajemo pripravcima: **Acrobat MZ**, **Melody Duo WP** ili **Forum Star WP**.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice u vinogradima. Za zaštitu od **pepelnice vinove loze** (*Erysiphe necator*) možete koristiti fungicide **Luna Experience SC**, **Collis SC**, **Crystal KS**, **Nativo WG**, **Domark ME**, **Postalon SC**, **Talendo**, **Dynali EC**, **Foliar 250** i sl.

Za zaštitu od **sive plijesni** (*Botrytis cinerea*) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: **Teldor SC 500**, **Chorus 75 WG**, **Cantus**, **Pyrus 400 SC** ili **Geoxe**.

Kako je u Križevcima 2010. potvrđena pojava **fitoplazme** *Flavescens doree*, a u 2011. je prvi puta potvrđena i zaraženost **američkog cvrčka**, na tom je području potrebno provoditi usmjerene mjere suzbijanja američkog cvrčka, a vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13). Suzbijanje američkog cvrčka **preporuča se i u ostalim vinogradima gdje su prošlih godina primijećeni simptomi fitoplazmoza**.

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se nakon cvatnje vinove loze.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi **Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin Max.**

Zbog zaštite pčela važno je da se **tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.**

**Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!**

*Mr. sc. Željka Oštrkapa-Međurečan*

*E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr*