
















27.6.2016.

Obavijest vinogradarima!

U posljednjih sedam dana groklimatska stanica u Virju zabilježila je vrlo visoku temperaturu zraka s maksimumima iznad 30 °C i visoku relativnu vlagu zraka. Velika količina kiše zabilježena je 19. i 20. lipnja te nove, povremene oborine 25. i 26. lipnja. Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju **pepelnice vinove loze** (*Erysiphe necator*), a oborine i noćna rosa omogućuju sekundarno širenje **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*), osobito u vinogradima s vidljivim simptomima bolesti i sporulacijom na naličju listova.

Virje_S34
Podaci od 14.6.2016. 2:00:00 do 27.6.2016. 12:00:00

	 °C	 °C	 °C	 %	 %	 %	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 mm	 %	 mm/m ²
pon, 2016.06.27	20,3	18,4	24,5	85,2	66,6	92,9	20,5	18,3	25,5	24	23,2	25,6	2,8	0	0
ned, 2016.06.26	24,1	18	30,5	76,6	53,8	96,8	24,1	18	31	25,3	23,4	27,7	34,7	0	0
sub, 2016.06.25	25,5	19,2	33,2	75,7	46,6	96,6	25,5	18,9	32,9	26,3	24,2	28,9	40,3	10	0
pet, 2016.06.24	27,3	19,4	34	71,1	44,6	95,5	27,1	19,1	34,9	25,8	23,4	28,6	11,8	0	0
čet, 2016.06.23	26	18,8	33,4	71,4	43,9	95,8	25,9	18,7	33,2	24,6	22,2	27,8	1,4	0	0
sri, 2016.06.22	23,7	16,1	30,9	75,7	50,4	99,9	23,7	15,9	31,2	22,9	20,9	25,1	31,2	0	0
uto, 2016.06.21	21,3	13,6	30	77,3	47,4	99,9	21,2	13,4	29,7	21,9	19,5	24,6	38,2	0	0
pon, 2016.06.20	19,2	13,3	26,6	83,1	48,9	99,9	18,9	13,1	25,7	21,1	19,1	23,8	53,5	22,6	0
ned, 2016.06.19	17,1	14,2	23,1	88,8	59,4	99,9	17,4	14,2	23,8	22,2	20,8	24,2	39,6	7,1	0
sub, 2016.06.18	21,8	13,9	29,7	58,8	29,6	84,6	21,6	13,8	29,7	23,4	20,7	26,8	0	0	0
pet, 2016.06.17	23,6	17,7	28,9	57,1	33,6	99	23,6	17,6	29,2	23,4	21,7	25,7	7,6	0	0
čet, 2016.06.16	23,7	16,5	31	61,5	39,2	90,1	23,6	16,1	31,4	22	19,4	25,3	0	0	0
sri, 2016.06.15	20	15,6	26	74,1	50,6	99,9	20,1	15,7	25,7	21	19,8	22,2	13,2	0,7	0
uto, 2016.06.14	19,9	12,9	26,5	76,9	47,6	99,9	20	12,7	28,1	21,4	19,4	23,4	27,1	1	0

Za drugu zaštitu od **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*) nakon cvatnje mogu se koristiti pripravci **Ridomil Gold Combi 45 WG, Forum Star, Curzate F, Pergado F, Pergado MZ, Galben F, Fantic F, Melody Duo WP, Galben M, Equation Pro, Profiler WG, Verita ili Electis WG.**

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore prednost dajemo pripravcima: **Acrobat MZ, Melody Duo WP ili Forum Star WP.**

Toplo i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice u vinogradima te možemo očekivati pojavu simptoma na bobama u slabije šticećenim vinogradima. Za zaštitu od **pepelnice vinove loze** (*Erysiphe necator*) možete koristiti fungicide **Luna Experience SC, Dynali EC, Collis SC, Falcon EC, Nativo WG, Domark ME, Crystal KS, Postalon SC, Talendo, Foliar 250 i sl.**

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi "antirezistentnu strategiju" pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25°C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željka Ošrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr