

18.05.2018.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju **lisnih uši** te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na **breskvi** dozvoljeni su insekticidi **Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG**, na **nektarini** su dozvoljeni **Calypso SC 480, Movento i Mospilan 20 SG**, a na **šljivi Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG**.

U nasadima **breskve** i dalje bilježimo let leptira prve generacije **breskvinog savijača** ([*Cydia molesta*](#)), a zabilježen je i ulov leptira **breskvinog moljca** ([*Anarsia lineatella*](#)). Ličinke prve generacije ubušuju se u vršak izboja, a suzbijanje ima smisla **samo u mladim nasadima breskve**.

U nasadima **šljive** bilježimo let prve generacije **šljivinog savijača** (*Cydia funebrana*), a pronađena su i odložena jaja. Prvu generaciju ima smisla suzbijati u voćnjacima gdje je zbog ranoproljetnih niskih temperatura razvijen manji broj plodova. Za tu su namjenu registrirani insekticidi **Decis 100 EC, Scatto, Rotor super, Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 250 WG, Insegar 25 WP**.

Za zaštitu lista **šljive** od bolesti kao što su narančasta pjegavost i hrđa šljive mogu se koristiti fungicidi **Dithane M-45, Pinozeb M-45, Kastor i Futura**, a za zaštitu nasade **breskve i nektarine** od bolesti mogu se koristiti pripravci **Captan WP 50, Kastor i Delan 700 WDG**.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željka Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljka.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr