

31.07.2018.

Obavijest proizvođačima oraha!

Krajem prošlog tjedna zabilježen je značajan porast populacije **orahove muhe** ([*Rhagoletis completa*](#)) na području Koprivnice te proizvođačima preporučamo da ponove tretiranje.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi **Imidan 50 WG** i **Calypso SC 480**. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i **metoda masovnog ulova** tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Orahova muha odlaže jaja u zelenu lupinu ploda. Ličinke orahove muhe žive i hrane se unutar zelene lupine pa ona s vremenom pocrni i zaljepi se za ljusku oraha. Let orahove muhe obično traje od sredine srpnja do kraja rujna, no štetniji je raniji napad jer može utjecati na kakvoću jezgre.

U proteklih pet godine štete od orahove muhe zabilježili smo na području cijele Koprivničko-križevačke županije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. Sc. Željka Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr